

SCINTIGRAPHIE au TEKROTYD®

Cet examen permet d'étudier les lésions neuro-endocrines exprimant certains types de récepteurs à la somatostatine.

Préparation

Aucune préparation.

Vous pouvez prendre vos médicaments habituels.

Démarches administratives

Le jour du rendez-vous, vous devez apporter :

- Votre carte d'assuré social et votre carte de mutuelle,
- Une pièce d'identité (carte d'identité, passeport),
- **Votre ordonnance,**
- Vos anciens examens en votre possession : scintigraphies, radiographies, scanner et/ou IRM.

Contre-indications

Cet examen n'est pas indiqué chez la femme enceinte.

Chez les femmes non ménopausées :

- Cet examen se réalise sous contraception (pilule ou implant contraceptif, stérilet, ligature des trompes)
- **Ou** après réalisation la veille du rendez-vous d'une analyse de béta-HCG, en laboratoire d'analyses médicales, résultats à apporter le jour de l'examen.

La prescription d'analyse de béta-HCG peut vous être envoyée par mail ou courrier.

Déroulement de l'examen

- Injection intraveineuse d'un produit faiblement radioactif.
- **4 heures après l'injection** : réalisation d'images sous la caméra pour une durée moyenne d'examen de 45 minutes.
- Il est recommandé de boire **au moins un litre d'eau** entre l'injection du produit et les images tardives dans le but de limiter votre irradiation.

Précautions après l'examen

Il est recommandé de boire régulièrement le jour de l'examen, afin de favoriser l'élimination urinaire du produit injecté.

Aucune mesure d'éviction particulière n'est recommandée pour l'entourage et les sujets contacts, y compris les enfants en bas âge et les femmes enceintes.

Si vous allaitez, merci de le signaler.

Les résultats

Ils sont envoyés à votre médecin prescripteur (compte-rendu + images).

Ils sont également archivés dans le service pour un éventuel contrôle ultérieur.

Codification	Version	Date
MN_FIP_004	3	09/08/2022